

Orvosi vizsgálatok a várandósság ideje alatt

0-12. hétig	Kötelező nőgyógyászati vizsgálatok, citológiai és kolposzkópos szűrés, terhesség megállapítása tapintással és ultrahangvizsgálattal	A menzesz kimaradása után két héttel, de legkésőbb a második menzesz kimaradása után érdemes orvoshoz fordulni.
	Vérkép-, vércsoport- és lueszserológiai	A kapott leletekkel a lakhely szerinti védőnőhöz kell fordulni a terheskönyvéért. A terhesgondozásba vételnek a 12. terhességi hét előtt meg kell történnie, mert a szülési segélyre csak ebben az esetben jogosult a kismama.
12. hét	Hüvelyi szűrő ultrahangvizsgálat Fontos: az ultrahangvizsgálat során nem vehető észre minden rendellenesség.	Ilyenkor ellenőrzik a terhesség pontos nagyságát, a gerinc állapotát, a magzati nyaki redő vastagságát, a végtagbimbók meglétét.
16. hét	AFP-vizsgálat	Vérvétel, mely a magzat által termelt alfafötöproteinnemennyiséget szűri. Ennek normál értéke meghatározott, az átlagtól való eltérés kóros elváltozásokra utalhat.
	– ha magasabb az átlagnál	Velőcső-záródási rendellenességekre, esetleg addig fel nem fedezett ikerterhességekre utalhat, genetikai vizsgálat javasolt.
	– ha az érték alacsonyabb	Down-szindróma gyanúja merül fel, genetikai vizsgálat javasolt.
	Hepatitiszszűrés	Az AFP-vel egyszerre végzik. Amennyiben az anya nem volt szűrve, vagy pozitív lett az eredmény, a szülés után az újszülöttet be kell oltani.
18. hét	Hasi UH-szűrés	Eredményét összevetik az AFP eredményével.
19-20. hetétől	Nőgyógyászati szűrővizsgálatra	Havonta egyszer.
	Ellenanyagszűrés	Ha az anya vércsoportja Rh-negatív, akkor havonta kell végezni a vérből. Ez a vizsgálat Rh "pozitív" anyáknál nem szükséges.
	Vérkép- és vizeletvizsgálat	Hat hetente minden terhesnél.
23. hét	Gestatio diabetes szűrés	Azaz a terhességi cukorbetegség szűrés. Ez két vérvételt jelent: először éhgyomorral, majd 50 gr szénhidrát elfogyasztása után egy órával ismét megnézik a vércukorértéket.
28. hét	Ultrahang- és nőgyógyászati vizsgálat	A magzatok a 28. hétig általában egyformán fejlődnek, ilyenkor átlagosan 1 kg súlyúak. Amennyiben ennél az ultrahangvizsgálatnál "megfelelő szögben" fekszik a magzat, már biztonsággal meg lehet mondani a baba nemét.
36. héttől	CTG (cardiothokografia) vizsgálat	Hetente szükséges, mely a magzat szív működését és a méh összehúzódásait regisztrálja. Ez a vizsgálat figyelmeztet a méhlepény esetleges elváltozásaira, a magzat állapota jól követhető vele.
38. hét	Utolsó ultrahangvizsgálat	A magzat nagyságát, fekvését, a placenta állapotát, a magzatvíz mennyiségét vizsgálják.
40. hét	Az érett szülés	
(+/-2 hét)	CTG-vizsgálat	Túlhordáskor, kétnaponta történik.
	Magzatvízvizsgálat	Amennyiben a méhszáj már nyitott és a CTG-n eltérés észlelhető végezhető. Ekkor a magzatvíz színét vizsgálják, mely a magzat állapotára utal.
	Szülésindítás	Átlagosan 10 nappal a kiírt terminus után történik.